

A decorative vertical pattern on the left side of the slide, consisting of numerous thin, wavy, light blue lines that create a textured, wood-grain-like effect.

FIMODIGO (fingolimod)

Karta przypominająca
dla pacjentek dotycząca ciąży



Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Fimodigo



Lek Fimodigo (fingolimod) jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet w ciąży i kobiet w wieku rozrodczym (w tym nastoletnich dziewcząt) niestosujących skutecznej antykoncepcji.

Podczas rozpoczynania leczenia, a następnie w regularnych odstępach czasu lekarz prowadzący będzie informował Panią o ryzyku teratogennym i niezbędnych działaniach minimalizujących to ryzyko.



Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać test ciążowy i uzyskać wynik negatywny, który powinien być zweryfikowany przez lekarza.



Lekarz poinformuje Panią o potrzebie stosowania skutecznej antykoncepcji podczas leczenia i przez 2 miesiące po jego zakończeniu. Należy porozmawiać z lekarzem o najbardziej skutecznych formach antykoncepcji dostępnych dla Pani.

Należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania z lekiem Fimodigo przekazanej przez lekarza.

Podczas przyjmowania leku Fimodigo



Podczas leczenia pacjentki nie mogą zajść w ciążę.

Pacjentki muszą stosować skuteczną antykoncepcję podczas przyjmowania leku Fimodigo.

Pacjentki nie mogą zajść w ciążę podczas leczenia i przez 2 miesiące po zakończeniu leczenia.

Testy ciążowe należy powtarzać w odpowiednich odstępach czasu.



Lekarz prowadzący będzie regularnie informował pacjentkę o poważnym ryzyku związanym ze stosowaniem leku Fimodigo dla płodu.

Podczas przyjmowania leku Fimodigo



Jeśli zajdzie Pani w ciążę lub jeśli chce Pani zajść w ciążę, należy omówić to z lekarzem, ponieważ leczenie lekiem Fimodigo musi zostać przerwane.

W przypadku ciąży lekarz udzieli Pani informacji.



Lekarz udzieli Pani porady medycznej dotyczącej szkodliwego wpływu leku Fimodigo na płód i przekaze ocenę potencjalnych skutków leczenia.




Należy wykonać badanie ultrasonograficzne i zakończyć leczenie lekiem Fimodigo.

Po zakończeniu leczenia lekiem Fimodigo



Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli uważa Pani, że występujące u Pani SM nasila się (np. występuje osłabienie lub zaburzenia widzenia) lub jeśli zauważy Pani jakiegokolwiek nowe objawy po zakończeniu leczenia lekiem Fimodigo z powodu ciąży.



Konieczne jest stosowanie skutecznej antykoncepcji przez 2 miesiące po zakończeniu leczenia lekiem Fimodigo z uwagi na czas, jaki jest potrzebny, by lek Fimodigo został usunięty z organizmu.





Vip pharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiłłów 9

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.: (+4822) 679 5135 fax: (+4822) 678 92 87

e-mail: vip pharm@vip pharm.com.pl

